

ISTRUZIONI ORTODONTICHE

Per il paziente che deve portare una mascherina di Contenzione Trasparente

Per i primi mesi l'apparecchio deve essere portato il più possibile, ovvero giorno e notte.

Ai successivi controlli verranno comunicati eventuali cambiamenti riguardo tempi e modi.

Con la rimozione dell'apparecchiatura fissa i denti hanno la tendenza a spostarsi e tornare nella posizione originaria, pertanto è preferibile consegnare la placca di contenzione nella stessa seduta. A tal proposito sarà fissato un appuntamento preventivo in cui verranno prese le impronte per lo sviluppo della contenzione.

Inizialmente è possibile che si verifichi un aumento della salivazione che passerà non appena la bocca si abituerà al nuovo dispositivo mobile.

E' importante prendersi cura del proprio apparecchio di contenzione:

- riporlo nell'apposita scatola quando non lo si ha in bocca per evitare smarrimenti o fratture dello stesso, in quanto occorrerebbe rifarlo e questo avrebbe un costo aggiuntivo al preventivo iniziale
- igienizzarlo quotidianamente sotto acqua corrente lavandolo con spazzolino e sapone liquido dopo ogni utilizzo. Invitiamo inoltre a disinfettare la placca una volta al giorno diluendo 5ml di Amuchina in 250ml di acqua fredda.

Ricordiamo di portare il dispositivo di contenzione ad ogni controllo.